

Insecticidas actualmente recomendados y registrados para el control de cochinillas harinosas en césped en Florida

Preparado por el Grupo de Trabajo sobre la Cochinilla Harinosa de los Pastos de UF/IFAS Extension.

Ingrediente Activo	Nombres Comerciales	Clase Química	Clase IRAC	Lugar de Aplicación
Acephate	Orthene	Organophosphate	1B	GC, S
Azadirachtin	Azatin, Azaguard	Azadirachtin	UN	GC, S, L
Beauveria bassiana strain GHA	BotaniGard, Mycotrol	Fungal agent	UNF	GC, S, L
Bifenthrin	Talstar, Menace	Pyrethroid	3	GC, S, L
Carbaryl	Sevin, Carbaryl 4L	Carbamate	1A	GC, S, L
*Clothianidin	Arena	Neonicotinoid	4A	GC, S, L
*Dinotefuran	Zylam	Neonicotinoid	4A	GC, S, L
Dinotefuran + alpha-cypermethrin	Alucion	Neonicotinoid + Pyrethroid	4A, 3	GC, L
Essential oils	Captiva, EpiShield, TetraCURB Max	-	UNM	GC, S, L
*Imidacloprid	Merit, Mallet	Neonicotinoid	4A	GC, S, L
Neem oil	Debug, Rango			GC, S, L
*Thiamethoxam	Meridian	Neonicotinoid	4A	GC, S, L
Zeta-cypermethrin + Bifenthrin + Imidacloprid	Triple Crown T&O, Golf	Pyrethroid + Neonicotinoid	3, 4A	GC, L

* La evidencia disponible actualmente indica que los neonicotinoides, como tiametoxam e imidacloprid, son las opciones de control químico más eficaces.

- Los nombres comerciales indicados no son exhaustivos y no implican el respaldo o recomendación de ningún producto en particular.
- Sitios de aplicación: campos de golf (GC), fincas de producción de césped (S) y áreas de paisajismo (L).
- Todos los productos deben mezclarse con un surfactante no iónico antes de la aplicación, salvo que la etiqueta del producto indique lo contrario.

Si tiene preguntas adicionales, comuníquese con el Dr. Adam Dale por correo electrónico agdale@ufl.edu